



Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 22. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$) là một hình thang cong khi hàm số $f(x)$

- A. liên tục trên $[a; b]$ B. không âm trên $[a; b]$
C. liên tục và không âm trên $[a; b]$ D. đồng biến trên $[a; b]$

Câu 2. Cho $f(x)$ liên tục, không âm trên $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành, $x = a$, $x = b$ bằng

- A. $F(a) - F(b)$ B. $F(a) + F(b)$ C. $F(b) - F(a)$ D. $f(b) - f(a)$

Câu 3. Cho $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$ B. $\int_a^b f(x) dx = f(b) - f(a)$
C. $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a)$ D. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tích phân $\int_3^3 f(x) dx$ bằng

- A. 3 B. $f(3)$ C. $2f(3)$ D. 0

Câu 5. Biết $\int_2^5 f(x) dx = 4$. Khi đó $\int_5^2 f(x) dx$ bằng

- A. 4 B. -4 C. 0 D. $\frac{1}{4}$

Câu 6. Cho hàm số f liên tục trên $[1; 3]$. Tích phân nào sau đây bằng $\int_1^3 f(x) dx$?

- A. $\int_3^1 f(x) dx$ B. $\int_1^3 f(x+1) dx$ C. $\int_1^3 xf(x) dx$ D. $\int_1^3 f(t) dt$

Câu 7. $\int_0^1 x dx$ bằng

- A. 1 B. 2 C. $\frac{1}{2}$ D. 0

Câu 8. $\int_0^2 x^3 dx$ bằng

- A. 4 B. 8 C. 2 D. 16

Câu 9. $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ bằng

- A. 1 B. e C. 0 D. $e - 1$

Câu 10. $\int_0^\pi \sin x dx$ bằng

- A. 0 B. -2 C. 1 D. 2

Câu 11. $\int_0^1 e^x dx$ bằng

- A. e B. $e + 1$ C. $1 - e$ D. $e - 1$

Câu 12. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x}$ bằng

- A. 1 B. 0 C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\sqrt{2}$

Câu 13. $\int_1^4 \sqrt{x} dx$ bằng

- A. $\frac{16}{3}$ B. $\frac{7}{2}$ C. $\frac{14}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 14. Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, $\int_0^2 (x+1) dx$ bằng diện tích hình thang vuông và bằng

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 2

Câu 15. Sử dụng ý nghĩa hình học của tích phân, $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$ bằng

- A. π B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. 2π

Câu 16. Biết $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 3$. Khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

- A. 6 B. 5 C. 1 D. -1

Câu 17. Biết $\int_0^2 f(x) dx = 4$. Khi đó $\int_0^2 3f(x) dx$ bằng

- A. 12 B. 7 C. $\frac{4}{3}$ D. 64

Câu 18. Biết $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_1^3 f(x) dx = 5$. Khi đó $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

- A. 3 B. 10 C. 7 D. -3

Câu 19. $\int_{-1}^1 |x| dx$ bằng

- A. 1 B. 0 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

Câu 20. $\int_0^1 (2x+3) dx$ bằng

- A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 21. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 2t$ (m/s). Quãng đường vật đi được trong 3 giây đầu là

- A. 9 m B. 6 m C. 3 m D. 18 m

Câu 22. Giá trị trung bình của hàm số $f(x) = 2x$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng

- A. 16 B. 4 C. 8 D. 2

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x$.

- a) Hàm số $F(x) = x^3 - x^2$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
- b) $\int_0^2 f(x) dx = 4$.
- c) $\int_2^0 f(x) dx = 4$.
- d) $\int_0^1 f(x) dx = 1$.

Câu 2. Xét $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x + 1) dx$.

- a) Hàm số $y = \sin x + x$ là một nguyên hàm của $\cos x + 1$.
- b) $I = 1 + \frac{\pi}{2}$.
- c) $I = \frac{\pi}{2}$.
- d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$.

Câu 3. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 6$ và $\int_1^3 g(x) dx = -2$.

- a) $\int_1^3 [f(x) + g(x)] dx = 4$.
- b) $\int_1^3 2f(x) dx = 12$.
- c) $\int_3^1 g(x) dx = -2$.
- d) $\int_1^3 f(x)g(x) dx = -12$.

Câu 4. Biết $\int_0^4 f(x) dx = 10$ và $\int_0^1 f(x) dx = 3$.

- a) $\int_1^4 f(x) dx = 7$.
- b) $\int_4^1 f(x) dx = -7$.
- c) $\int_0^4 2f(x) dx = 12$.
- d) $\int_1^4 [f(x) + 1] dx = 10$.

Câu 5. Xét $I = \int_0^3 |x - 2| dx$.

- a) Trên đoạn $[0; 2]$, $|x - 2| = x - 2$.
- b) $I = \int_0^2 (2 - x) dx + \int_2^3 (x - 2) dx$.
- c) $I = \frac{5}{2}$.
- d) $\int_0^3 (x - 2) dx = \frac{5}{2}$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ với $x \in [-2; 2]$.

- a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ là nửa đường tròn tâm O , bán kính 2, nằm phía trên trục hoành.
- b) $\int_{-2}^2 f(x) dx = \pi$.
- c) $\int_0^2 f(x) dx = \pi$.
- d) $\int_{-2}^2 f(x) dx = 2 \int_0^2 f(x) dx$.

Câu 7. Xét $I = \int_0^{\ln 3} e^x dx$.

- a) $I = 2$.
- b) $I = 3$.
- c) $\int_0^{\ln 3} (e^x + 1) dx = 2 + \ln 3$.
- d) $\int_{\ln 3}^0 e^x dx = 2$.

Câu 8. Một ô tô đang chạy thì phanh, sau đó chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = 10 - 5t$ (m/s), t tính bằng giây kể từ lúc phanh.

- a) Ô tô dừng hẳn sau 5 giây.
- b) Từ lúc phanh đến khi dừng ô tô đi được 10 m.
- c) Trong giây đầu tiên sau khi phanh ô tô đi được 7,5 m.
- d) Trong giây thứ hai ô tô đi được 5 m.

Câu 9. Nhiệt độ $T(t)$ ($^{\circ}\text{C}$) của một phòng thí nghiệm sau t giờ là $T(t) = 20 + 2t$, $0 \leq t \leq 6$.

- a) $\int_0^6 T(t) dt = 156$.
- b) Nhiệt độ trung bình trong 6 giờ là 26°C .
- c) Nhiệt độ trung bình bằng $T(4)$.
- d) $\frac{T(0) + T(6)}{2} = 32$.

Câu 10. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x$.

- a) $\int_0^3 f(x) dx = 0$.
- b) $f(x) \geq 0$ với mọi $x \in [0; 2]$.
- c) $\int_0^3 |f(x)| dx = \frac{8}{3}$.
- d) $\int_0^2 f(x) dx = \frac{4}{3}$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.

Câu 1. Tính $\int_1^2 \left(2x + \frac{1}{x^2}\right) dx$.

Câu 2. Tính $\int_0^\pi (2 \sin x + 1) dx$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Tính $\int_0^2 |x^2 - 1| dx$.

Câu 4. Tính $\int_{-1}^2 |x - 1| dx$.

Câu 5. Tìm số thực $m > 0$ thỏa mãn $\int_0^m (3x^2 - 2) dx = 4$.

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 1$ và $f'(x) = 3x^2 + 4x$ với mọi x . Tính $f(2)$.

Câu 7. Biết $\int_1^3 f(x) dx = 4$. Tính $\int_1^3 [2f(x) - 3x^2] dx$.

Câu 8. Tính $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 9. Tính $\int_0^{\ln 2} (e^x + 1)^2 dx$ (làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 10. Tính giá trị trung bình của hàm số $f(x) = x^2 - 2x + 3$ trên đoạn $[0; 3]$.

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một đoàn tàu điện rời ga, trong 10 giây đầu chạy với vận tốc $v(t) = 0,5t + 2$ (m/s), sau đó chạy đều với vận tốc 7 m/s (hình dưới).




- a) $v(10) = 7$ m/s.
- b) Trong 10 giây đầu đoàn tàu đi được 45 m.
- c) Trong 10 giây tiếp theo đoàn tàu đi được 70 m.
- d) Trong 20 giây đầu đoàn tàu đi được 105 m.

Câu 2. Nước chảy ra từ vòi của một bồn chứa với tốc độ $r(t) = 10 - 0,5t$ (lít/phút), $0 \leq t \leq 20$, t tính bằng phút (hình dưới).




- a) Trong 20 phút, lượng nước chảy ra là 100 lít.
- b) Trong 10 phút đầu, lượng nước chảy ra là 50 lít.
- c) Tốc độ chảy trung bình trong 20 phút là 7,5 lít/phút.
- d) Tại thời điểm $t = 20$, nước ngừng chảy.

Câu 3. Doanh thu cận biên của một cửa hàng khi bán x sản phẩm là $R'(x) = 100 - 0,2x$ (nghìn đồng/sản phẩm), $0 \leq x \leq 500$, và $R(0) = 0$ (hình dưới).




- a) Doanh thu khi bán 100 sản phẩm là 9000 nghìn đồng.
- b) Doanh thu tăng thêm khi bán từ sản phẩm thứ 101 đến sản phẩm thứ 200 là 7000 nghìn đồng.
- c) Vì $R'(x)$ giảm nên doanh thu $R(x)$ giảm khi x tăng.
- d) Doanh thu lớn nhất khi bán 500 sản phẩm.

Câu 4. Nhiệt độ $T(t)$ ($^{\circ}\text{C}$) trong một nhà kính sau t giờ kể từ 5 giờ sáng là $T(t) = 18 + 2t - 0,1t^2$, $0 \leq t \leq 20$ (hình dưới).



- a) $T(10) = 30^{\circ}\text{C}$.
- b) Nhiệt độ trung bình trong 20 giờ xấp xỉ $24,67^{\circ}\text{C}$.
- c) Nhiệt độ trung bình lớn hơn nhiệt độ lúc 5 giờ sáng.
- d) $\int_0^{20} T(t) dt = 500$.

Câu 5. Một cổng có dạng parabol, chân cổng rộng 4 m, chiều cao 4 m. Chọn hệ trục tọa độ sao cho chân cổng là đoạn $[-2; 2]$ trên trục hoành, đường cong của cổng là đồ thị $y = 4 - x^2$ (hình dưới). Người ta sơn mặt trước của cổng với giá 200 nghìn đồng/m².




- a) Diện tích mặt trước của cổng bằng $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3} \text{ m}^2$.
- b) Diện tích mặt trước của cổng xấp xỉ 10,5 m².
- c) Chi phí sơn xấp xỉ 2,13 triệu đồng.
- d) Diện tích mặt trước của cổng bằng $\frac{2}{3}$ diện tích hình chữ nhật có hai kích thước 4 m và 4 m.


Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.


Câu 1. Một xe máy xuất phát, trong 4 giây đầu chạy với vận tốc $v(t) = 3t$ (m/s), sau đó chạy đều với vận tốc 12 m/s (hình dưới). Tính quãng đường (m) xe đi được trong 10 giây đầu.




Câu 2. Trong một trận mưa kéo dài 12 giờ, cường độ mưa là $r(t) = 0,6t - 0,05t^2$ (mm/giờ), t tính bằng giờ (hình dưới). Tính tổng lượng mưa (mm) của trận mưa.




Câu 3. Dân số của một thị trấn tăng với tốc độ $P'(t) = 2 + 0,3t$ (nghìn người/năm), t tính bằng năm. Hiện tại ($t = 0$) thị trấn có 50 nghìn người (hình dưới). Hỏi sau 10 năm thị trấn có bao nhiêu nghìn người?



Câu 4. Một ô cửa kính có dạng hình phẳng giới hạn bởi đường parabol $y = 2 - \frac{x^2}{2}$ và trục hoành (đơn vị: mét, hình dưới). Kính có giá 1,5 triệu đồng/m². Tính số tiền (triệu đồng) mua kính cho ô cửa.



Câu 5. Một máy bơm hút nước ra khỏi hầm với tốc độ $r(t) = 40 - 2t$ ($\text{m}^3/\text{giờ}$) cho đến khi tốc độ bằng 0 (hình dưới). Tính lượng nước (m^3) máy đã bơm được.



————— **HẾT** —————

MR BLACK